

ARTRIOFIN® Comprimido Oral

ANTIINFLAMATORIO NO ESTEROIDAL.



Indicado en el alivio del dolor e inflamación asociada a cuadros osteoarticulares agudos o crónicos, tales como la osteoartritis canina. Su uso también se recomienda en el control del dolor post operatorio asociado a cirugías ortopédicas y de tejidos blandos.

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros.

FORMA FARMACÉUTICA

Comprimido oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiinflamatorio no esterooidal.

COMPOSICIÓN

Cada comprimido contiene:
Carprofeno..... 88 mg
Excipientesc.s.p.....1 comprimido

INDICACIONES

Indicado en el alivio del dolor e inflamación asociada a cuadros osteoarticulares agudos o crónicos, tales como la osteoartritis canina. Su uso también se recomienda en el control del dolor post operatorio asociado a cirugías ortopédicas y de tejidos blandos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administración oral.

- **Dosis del principio activo:** 4,4 mg/Kg una vez al día o 2,2 mg/Kg dos veces al día, por 7 a 10 días.
- **Dosis del producto:** 1 comprimido por cada 20 Kg de peso una vez al día, o dividido en dos dosis de ½ comprimido cada 12 horas, por 7 a 10 días.

El Médico Veterinario debe evaluar al paciente para continuar con el tratamiento. En el control del dolor post-operatorio se recomienda su administración 2 horas antes del procedimiento.

CONTRAINDICACIONES

- No usar en conjunto con otros antiinflamatorios no esteroidales ni corticoides.
- No administrar en hembras preñadas o en lactancia.
- No administrar en perros menores de 6 semanas de vida.
- No administrar en perros deshidratados, hipovolémicos o hipotensos, con alteraciones cardíacas, hepáticas o renales.
- No administrar en perros con úlceras gastroduodenales, discrasias sanguíneas o hipersensibilidad al principio activo.
- No usar con otros derivados del Ácido Propiónico.

PRECAUCIONES

Utilizar con precaución en animales de mayor edad.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

EFFECTOS ADVERSOS

El uso prolongado de **Artriofin®** puede causar lesiones gastrointestinales, inapetencia, vómitos y diarrea. Ante la aparición de estos síntomas, debe consultar inmediatamente al Médico Veterinario tratante.

CONSERVACIÓN

Conservar en un lugar fresco y seco, a temperatura ambiente entre 15 y 30°C.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Estuche con 10 comprimidos.

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG N° 1617

Costa Rica: Reg. N° MAG CL4-14-4-5800

Rep. Dominicana: Reg. N° 8863

Uruguay: Reg. MGAP N° A-4457

Bolivia: Reg. SENASAG PUV- N° 010001/21

PAÍSES DONDE SE COMERCIALIZA

Importado y distribuido en Bolivia por:

ZOOFARMA

TEL: +(591)222-3357

Calle Díaz Romero 1339, entre avenida Saavedra y Avenida Busch, La Paz.

Importado en Uruguay por:

VIVAFIL S.A.

RIO NEGRO 1107 Montevideo - Uruguay, TEL 29001112

grupotecnovet@gmail.com

Director Técnico: DMTV Diego Cuadrado.

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico

Veterinario