INVECTINA® Solución Inyectable

ANTIPARASITARIO DE AMPLIO ESPECTRO



Endectocida indicado en el tratamiento de parásitos gastrointestinales (*Ostertagia sp., Nematodirus sp., Oesophagostomum sp.,Haemonchus sp., Cooperia sp., Strongylus sp., Trichuris sp., Ascaris sp. Trichostrongylus sp.)* y pulmonares (*Dictyocaulus sp.*), incluyendo sus larvas migratorias e inhibidas.

Efectivo en el tratamiento de ácaros de la sarna (*Sarcoptes scabiei, Psoroptes sp.*), piojos (*Linognathus sp., Haematopinus sp.*) y *Oestrus ovis*.

Ficha Técnica

ESPECIES

Bovinos, ovinos, caprinos y cerdos.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiparasitario de amplio espectro

COMPOSICIÓN

Cada 1 mL de solución inyectable contiene:

Ivermectina.....10 mg

Excipientes c.s.p.....1 mL

INDICACIONES

Endectocida indicado en el tratamiento de parásitos gastrointestinales (*Ostertagia sp., Nematodirus sp., Oesophagostomum sp.,Haemonchus sp., Cooperia sp., Strongylus sp., Trichuris sp., Ascaris sp. Trichostrongylus sp.*) y pulmonares (*Dictyocaulus sp.*), incluyendo sus larvas migratorias e inhibidas.

Efectivo en el tratamiento de ácaros de la sarna (Sarcoptes scabiei, Psoroptes sp.), piojos (Linognathus sp., Haematopinus sp.) y Oestrus ovis.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía de administración:

Subcutánea

Dosis y modo de empleo:

- Bovinos, ovinos y caprinos: 1 mL/50 Kg de p.v (equivalentes a 0,2 mg de lvermectina/Kg de p.v) en dosis única. Repetir la dosis a los 7 días en caso de sarna ovina.
- Cerdos: 3 mL/100 Kg de p.v (equivalentes a 0,3 mg de Ivermectina/Kg de p.v) en dosis única.

No administrar más de 10 mL por punto de inyección.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

No se recomienda utilizar en forma concomitante con otros productos farmacéuticos

CONTRAINDICACIONES

- No administrar a animales menores de 4 semanas.
- No utilizar en animales hipersensibles a Ivermectina

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

- No manipular por personas hipersensibles a Ivermectina
- En caso de contacto con piel, ojos o mucosas, lavar inmediatamente con abundante agua.
- No fumar, beber o comer mientras se administra el producto.
- En caso de inyección acudir inmediatamente a un centro médico y mostrar la etiqueta del producto.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

EFECTOS ADVERSOS

Puede ocurrir inflamación en el sitio de inyección que se resuelve sin tratamiento.

PERÍODO DE RESGUARDO

Carne: 49 días.

Leche: No destinar a consumo humano la leche de los animales tratados.

OBSERVACIONES

Precauciones especiales para la disposición del producto sin utilizar o el material de desecho:

Desechar los restos de producto sin utilizar dentro de su envase original. No arrojar el envase vacío o con restos de producto, en ríos, lagos o torrentes de agua, ya que el producto es extremadamente tóxico para especies acuáticas. No arrojar los envases vacíos o con resto de producto junto con los desechos domésticos. No reutilizar el envase.

CONSERVACIÓN

Almacenar entre 15 y 30 °C, protegido de la luz. Una vez abierto el envase, utilizar dentro de 12 semanas. Descartar el producto sin usar después de ese período de tiempo.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Frasco ampolla con 50 mL y 100 mL, frasco con 500 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG Nº 623-B

Bolivia: Reg. SENASAG PUV-F N° 007257/16

Perú: Registro SENASA F.09.01.I.0239

PAÍSES DONDE SE COMERCIALIZA

Importado y distribuido en Bolivia por:

AGROGUARANI SRL TEL: +(591)314-1401

Santa Cruz de la Sierra-Bolivia

Importado y Distribuido en Perú por:

Representaciones Durand SAC.

Av. Manuel Olguín N° 501 Oficina N° 604 Santiago de Surco Lima.

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario