

LEVANTEL® 2%



LEVAMISOL CLORHIDRATO 2,2% SOLUCIÓN ORAL

Código

400244

Composición

Cada 1 mL de producto contiene:

Levamisol clorhidrato 22 mg
(Equivalentes a 18,7 mg de Levamisol base)
Excipientes c.s.p. 1 mL

Especie de destino

Perros y gatos.

Indicaciones

Control de parasitismo gastrointestinal en cachorros y gatitos, por las siguientes especies: *Toxacara canis*, *Toxacara cati*, *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala*.

Inmunoestimulación de perros y gatos.

Vía de administración y dosis

Vía oral.

Antiparasitario: en cachorros y gatitos: 6 – 8 gotas de LEVANTEL® 2% por kg de peso (6 - 8 mg de Levamisol base / kg P.V.). Repetir cada 2 semanas. Administrar a partir de las 2 semanas de edad en cachorros y desde las 4 semanas de edad en gatitos, cada 2 semanas hasta las 8 semanas de edad (en ambas especies).

Inmunoestimulante: en perros y gatos: 2 gotas de LEVANTEL® 2% por kg de peso (2 mg de Levamisol base/kg P.V.). Alternar 3 días con tratamiento y 3 días sin éste, durante 2 semanas. Alternar 3 días con tratamiento y 3 días sin éste, durante 2 semanas; repetir este ciclo una vez al mes durante 3 meses, o según indicación del Médico Veterinario tratante.

Advertencias y precauciones especiales de uso

El Médico Veterinario responsable debe evaluar el uso de este producto en animales debilitados o enfermos.

Contraindicaciones

Hepatopatías, Nefropatías. No administrar a hembras preñadas ni lactantes. No administrar a cachorros ni gatitos menores de 10 días de edad ni a animales hipersensibles a Levamisol Clorhidrato.

Uso durante preñez, lactancia y en animales reproductores

No administrar a hembras preñadas ni lactantes.

Efectos no deseados y reacciones adversas

La eliminación de los parásitos muertos puede generar diarrea y/o vómitos leves, especialmente en casos de parasitosis moderada a severa; estos síntomas son de carácter transitorio, por efecto mecánico de la expulsión de la masa de parásitos muertos y por lo tanto, independiente del tipo de antiparasitario utilizado. En perros: vómitos, diarrea, jadeo, excitación. En gatos: vómitos, sialorrea, excitación y midriasis.

Interacción con otros medicamentos

Interacción de tipo farmacodinámico, por aumento de la toxicidad de Levamisol al administrar en conjunto con drogas nicotínicas como Pirantel o Morantel y otras drogas inhibidoras de colinesterasa como Organofosforados y Neostigmina.

Sobredosis

Exacerbación de los efectos adversos; el uso de sulfato de atropina ayuda a aliviar los signos. Dosis de 15 mg de Levamisol base/kg P.V. pueden producir signología nerviosa (ataxia y convulsiones). Los cuales desaparecen sin dejar secuelas en el animal.

Período de eficacia

36 meses. Utilizar inmediatamente una vez abierto y descartar el producto sobrante.

Almacenamiento

Mantener a temperatura ambiente (entre 15-30°C), en lugar seco, protegido de la luz, en su envase original, debidamente rotulado y bien cerrado.

Presentación

Estuche conteniendo frasco plástico gotario de 10 mL

Condición de venta

Venta bajo receta médico-veterinaria.

Fabricado y distribuido por

Veterquímica S.A.

Importado y distribuido por

Veterquímica Boliviana S.R.L.

USO VETERINARIO

Chile Reg. SAG N°660

Bolivia Reg. SENASAG PUV - F N° 000252/03