

INVECLOR® - Jabón antiséptico

JABÓN ANTISÉPTICO DE PIEL Y MUCOSAS.



INVECLOR®, Clorhexidina Gluconato 2%, jabón líquido, está indicado como Jabón antiséptico de piel y mucosas.

Ficha Técnica

ESPECIES

Caballos.

DESCRIPCIÓN

El producto INVECLOR®, combina las ventajas de limpiadores jabonosos con un antiséptico eficaz, de amplio espectro y seguro como la Clorhexidina, por lo que es ideal para tratar áreas de piel y/o mucosas en donde se requiera disminuir la contaminación en forma rápida y persistente.

La Clorhexidina presenta un amplio espectro de actividad antimicrobiana. Es muy efectiva contra bacterias Gram positivas, especialmente contra *Staphylococcus aureus*, otros estafilococos y varias especies de estreptococos. Es menos efectiva contra Gram negativas como *Escherichia coli*, *Klebsiella*, *Salmonella* y *Pseudomonas*. Es capaz de impedir la germinación de esporas bacterianas. Es medianamente activa contra *M. tuberculosis*. Es activa frente a hongos como *Candida albicans*, *Microsporium gypseum*, *M. canis* y *Trichophyton mentagrophytes* y levaduras. Presenta actividad variable contra virus.

FORMA FARMACÉUTICA

Jabón líquido. Clorhexidina Gluconato 2%.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Jabón antiséptico de piel y mucosas.

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de jabón contiene:

Clorhexidina Gluconato.....2 g

Excipientes c.s.p.....100 mL

INDICACIONES

INVECLOR[®], Clorhexidina Gluconato 2%, jabón líquido, está indicado como Jabón antiséptico de piel y mucosas.

MODO DE APLICACIÓN

Previo a la aplicación de este producto, remover la suciedad y contaminación de la zona a tratar. Luego, humedecer el área y aplicar el producto directamente sobre la piel y/o mucosas en cantidad suficiente para que la zona quede totalmente cubierta. Restregar (con cepillo, escobilla, esponja o manualmente) el área suavemente durante 5 minutos. Enjuagar con abundante agua para retirar la totalidad del producto y secar con una toalla, gasa o compresa estéril.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Uso tópico.

Disponer abundante cantidad de INVECLOR[®], Clorhexidina Gluconato 2%, jabón líquido, en la zona de piel y/o mucosa a tratar de manera que ésta quede totalmente cubierta por el producto.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

No mezclar con otros desinfectantes y antisépticos.

CONTRAINDICACIONES

- No usar en animales que presentan hipersensibilidad a la clorhexidina gluconato.
- Contraindicado en casos de animales con heridas, ya que su uso retrasa el proceso

de cicatrización.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

- Se debe dejar actuar el producto aplicado durante 5 minutos antes de enjuagar.
- Para mejorar las condiciones de antisepsia, se recomienda depilar área tratada antes del uso de este producto.
- No utilizar en ojos, oídos, ni interior de la boca del animal; en caso de contacto lavar con abundante agua.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

- No debe ser manipulado por personas hipersensibles a Clorhexidina.
- Lavarse las manos después de su uso. Se recomienda el uso de guantes.
- En caso de contacto con la piel o con los ojos se recomienda lavar con abundante agua. Si se desarrolla irritación y esta persiste, consultar al médico.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

PERÍODO DE RESGUARDO

0 días.

OBSERVACIONES

Uso durante la preñez y lactancia:

Indicado para su uso seguro en hembras preñadas o en lactancia.

CONSERVACIÓN

Almacenar en un lugar seco a temperaturas entre 2 y 30° C protegido de la luz.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta libre.

USO VETERINARIO.

USO EXTERNO.

PRESENTACIÓN

Botella con 1 Litro

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma.

REGISTROS

Reg. SAG N° 2242.

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario