

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PIMOCARD



DESCRIPCIÓN

Inotrópico positivo y vasodilatador periférico en comprimidos para perros, en base a Pimobendan.
ADMINISTRACIÓN VIA ORAL

PRESENTACIÓN

Tradicional: Estuches con 2 blisters de 10 comprimidos cada uno.
Hospitalaria: Estuches con 10 blisters de 10 comprimidos cada uno.

ACCIÓN

Aumenta la fuerza de contracción cardíaca debido a dos mecanismos:

- 1) sensibilización del miocardio a los efectos del calcio.
 - 2) por inhibición de la enzima fosfodiesterasa-III.
- Reduce la resistencia vascular generando vasodilatación.

ACCIONES SECUNDARIAS:

Prolonga el potencial de acción de la célula cardíaca y reduce la tendencia a arritmias por reentradas.
Evita la agregación plaquetaria e impide la formación de trombos.
Reduce las catecolaminas y por consecuencia el estrés

INDICACIONES

Insuficiencia cardíaca congestiva tipo C en perros debido a insuficiencia valvular o cardiomiopatía dilatada.

FÓRMULA

Cada comprimido contiene:
Pimobendan 1,25 mg/2,5mg ,5mg y 10 mg según presentación.
Excipientes c.s.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Perros: 0,2 y 0,6 mg de pimobendán por kg de peso por día repartida en dos administraciones de 0,25 mg por kg cada una (equivalente a 1 comprimido cada 5 kilos, cada 10 kilos o cada 20 kilos o cada 40 kilos cada 12 horas según presentación). Se recomienda administrar una hora antes de las comidas.

CONTRAINDICACIONES

No se debe administrar en casos de cardiomiopatías hipertróficas o condiciones clínicas donde no sea posible un aumento del gasto cardíaco debido a condiciones funcionales o anatómicas (p.ej.: estenosis aórtica). Como pimobendán se metaboliza en el hígado, no debe utilizarse en perros que padecen insuficiencia hepática grave. No usar en caso de hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

EFECTOS COLATERALES

En ocasiones poco comunes se han notificado reacciones adversas gastrointestinales, tales como vómitos y diarrea.

RESTRICCIONES DE USO

Solo se recomienda su uso durante la gestación y la lactancia si el beneficio terapéutico supera el riesgo potencial. No es recomendable utilizar en cachorros.

PRECAUCIÓN

La absorción del producto se modifica cuando se administra con el alimento. Por lo tanto, la eficacia óptima se obtiene con el estómago vacío, debe administrarse una hora antes de las comidas. En animales diabéticos, los niveles de glucosa deben controlarse de forma estricta.

ELABORADO POR: HOLLYDAY-SCOTT S.A.

Int. Neyer 924 Beccar Buenos Aires, Argentina

