

LOMBRIMIC® Suspensión Oral

ANTIPARASITARIO INTERNO DE AMPLIO ESPECTRO.



Esta indicado para el tratamiento de formas maduras e inmaduras de parásitos gastrointestinales, pulmonares y tenias, incluyendo acción ovicida.

Ficha Técnica

ESPECIES

Bovinos, ovinos, caprinos, cerdos y caballos.

FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiparasitario interno de amplio espectro.

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL contiene:

Fenbendazol.....10 g

Excipientes c.s.p.....100 mL

INDICACIONES

Esta indicado para el tratamiento de formas maduras e inmaduras de parásitos gastrointestinales, pulmonares y tenias, incluyendo acción ovicida.

ESPECTRO DE ACCIÓN

Bovinos, ovinos y caprinos: *Haemonchus spp.*, *Cooperia spp.*, *Ostertagia spp.*, *Trichostrongylus spp.*, *Oesophagostomum spp.*, *Strongyloides spp.*, *Trichuris spp.*, *Bunostomum spp.*, *Dictyocaulus spp.*, *Nematodirus spp.*, *Chabertia ovina*, *Moniezia spp.*

Caballos: Grandes y pequeños estróngilos, *Parascaris equorum*, *Trichonema spp.*, *Trichostrongylus axei*, *Strongyloides westeri*.

Cerdos: *Oesophagostomum spp.*, *Metastrongylus spp.*, *Trichuris suis*, *Ascaris suum*, *Strongyloides ransomi*.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administrar por vía oral mediante pistola dosificadora o jeringa.

Dosis:

- **Bovinos, ovinos, caprinos, cerdos:** 5 mL/100 Kg de peso (Equivalentes a 5 mg de Fenbendazol/Kg de peso). Dosis única.
- **Caballos:** 7,5 mL / 100 Kg de peso en dosis única (Equivalentes a 7,5 mg de Fenbendazol/Kg de peso).Dosis única.

CONTRAINDICACIONES

No administrar en animales con hipersensibilidad conocida a Fenbendazol.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

- Uso de guantes al momento de administrar el producto.
- Lavarse las manos después de manipular el producto.
- No comer, beber ni fumar mientras manipula el producto.
- No manipular por personas hipersensibles a Fenbendazol.
- Evitar el contacto con piel, ojos, o boca.
- En caso de ingestión accidental, acudir inmediatamente a un centro médico y mostrar etiqueta del producto.
- En caso de contacto con piel, ojos o boca, lavar inmediatamente con abundante agua.
- En caso de irritación de piel, acudir inmediatamente a un centro médico y mostrar etiqueta del producto.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

PERÍODO DE RESGUARDO

- **Bovinos:** Carne: 14 días. Leche: 7 días
- **Caballos:** No administrar en animales cuya carne se destine a consumo humano
- **Ovinos y caprinos:** No administrar en animales cuya leche se destine a consumo humano.

OBSERVACIONES

Agitar vigorosamente antes de usar.

Precauciones especiales para el producto sin utilizar o el material de desecho:

- Envases vacíos pueden ser descartados como residuo doméstico, sin ninguna precaución especial.
- No eliminar los envases con restos de producto en el suelo o cursos de agua.
- Para productos vencidos o no utilizados contactar al laboratorio fabricante.

CONSERVACIÓN

Almacenar entre 15 y 30° C, protegido de la luz.

Una vez abierto el envase, utilizar dentro de 12 semanas. Descartar el producto sin usar después de ese período de tiempo.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Envase con 100 mL, 500 mL, 1 Litro y 3 Litros.

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

- Chile: Reg. SAG N° 0624

- Rep. Dominicana: Reg. N° 6516

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario