

# METRICINA®

---

## ANTIBIÓTICO.



## Ficha Técnica

### ESPECIES

---

Perros.

### DESCRIPCIÓN

---

Metricina®, Comprimido oral, está indicado para el tratamiento de afecciones buco dentales (gingivitis, estomatitis y periodontitis) en perros, causadas por bacterias susceptibles a la asociación, tales como Moraxella spp., Bacteroides spp., Porphyromonas (Bacteroides) asaccharolyticus, Peptostreptococcus spp., Espiroquetas patógenas orales y Treponema spp.

### FORMA FARMACÉUTICA

---

Comprimidos.

### ACCIÓN TERAPÉUTICA

---

Antibiótico.

### COMPOSICIÓN

---

Cada comprimido contiene:  
Metronidazol.....125 mg  
Espiramicina.....750.000 U.I.  
Excipientes c.s.p..... 1 comprimido

### VÍA DE ADMINISTRACIÓN

---

Oral.

### DOSIS

---

Dosis de los principios activos: 12,5 mg de Metronidazol y 75.000 U.I. de Espiramicina por kilo de

peso, una vez al día, durante 7 a 10 días. Dosis del producto: Un comprimido por cada 10 kilos de peso, una vez al día, durante 7 a 10 días. Vía oral. Administrar junto con el alimento o directamente en la boca del animal.

#### INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

---

- El Metronidazol interactúa con Cimetidina. El metabolismo hepático del Metronidazol se ve disminuido cuando se administran ambos fármacos de manera conjunta.
- El Fenobarbital puede inducir enzimas microsomales hepáticas, aumentando el metabolismo del Metronidazol, resultando en menor vida media y concentraciones plasmáticas.
- El efecto de los macrólidos puede ser antagónico al ser utilizados en conjunto con Cloranfenicol o lincosamidas.
- No utilizar en forma concomitante con otros productos farmacéuticos.

#### CONTRAINDICACIONES

---

- No utilizar en animales con hipersensibilidad al Metronidazol, derivados nitroimidazólicos o Espiramicina.
- No administrar en animales severamente debilitados.
- No administrar en hembras preñadas o en lactancia.
- No administrar en animales reproductores.
- No usar en conjunto a Cloranfenicol o lincosamidas.

#### PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

---

- Use guantes para administrar el producto.
- Lavarse las manos después de la administración del producto.
- No comer, beber o fumar en el momento de la manipulación y administración del producto.
- En caso de ingestión accidental, no inducir el vómito. Acudir a un centro médico cercano.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua por al menos 15 minutos. En el caso de existir algún tipo de irritación se recomienda acudir al médico.

#### OBSERVACIONES

---

##### USO VETERINARIO

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

#### PRESENTACIÓN

---

Estuche con 10 comprimidos

#### ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR

---

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.  
Lautaro N° 300 • Quilicura • Santiago • Chile

#### REGISTROS

---

Reg. SAG N° 2476-B

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario