



HIDROCORTISONA ACEPONATO 0,584 MG/ML

Antiinflamatorios - Solución Spray

REG. SAG N° 2164

COMPOSICIÓN

Cada 1 mL de producto contiene:
Hidrocortisona aceponato (HCA) 0,584 mg
Excipientes c.s.p. 1,0 mL

ESPECIES DE DESTINO

Perros.

INDICACIONES DE USO

Tratamiento sintomático de dermatitis inflamatorias y pruriginosas en perros.

DOSIFICACIÓN, VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Dosificación: 1,52 µg de Hidrocortisona aceponato/cm² de piel, cada 24 horas, durante 7 días consecutivos (2 atomizaciones de Hidrocortisona aceponato 0,584 mg/mL para una superficie de piel de 10 cm x 10 cm/día).

Vía de administración: Uso tópico, cutáneo

Modo de empleo:

Colocar el atomizador en la boca del frasco.

Aplicar pulsando el atomizador, a una distancia de 10 cm de la zona de piel a tratar, sin necesidad de realizar ningún masaje. Si es necesario rociar la cara, cubrir los ojos del animal.

Si no hay mejoría luego de 7 días de tratamiento, el Médico Veterinario a cargo deberá re-evaluar prolongar el tratamiento, en cuyo caso el perro deberá ser sometido a controles periódicos.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Mantener fuera del alcance de los niños y otros animales domésticos.

La superficie corporal tratada no debiera exceder una correspondiente a – por ejemplo – los dos flancos desde la columna a las líneas mamarias, incluyendo hombros y muslos. De otra forma, usar sólo de acuerdo a la evaluación riesgo/beneficio y someter al perro a evaluaciones clínicas regulares.

En caso de infecciones bacterianas, micóticas o parasitarias, se debe realizar un control de éstas mediante el tratamiento adecuado, bajo prescripción del Médico Veterinario.

En pacientes con Hiperadrenocorticismio (Síndrome de Cushing) y en aquellos menores a 7 meses de edad, el uso de Hidrocortisona aceponato 0,584 mg/mL está condicionado por la evaluación de la relación riesgo/beneficio que realice el Médico Veterinario tratante.

Una vez abierto el producto, utilizar dentro de 6 meses y mantener bajo las mismas condiciones de almacenamiento mencionadas más adelante.

CONTRAINDICACIONES

No utilizar en animales con hipersensibilidad conocida a Hidrocortisona.

No aplicar en zonas con úlceras cutáneas.

No aplicar en hembras preñadas o durante la lactancia.

EFFECTOS ADVERSOS Y REACCIONES ADVERSAS

Reacciones locales transitorias en el sitio de aplicación (eritema y/o prurito), pueden ocurrir en casos muy raros.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente: a no más de 30 °C, en un lugar seco y protegido de la luz solar y fuentes de ignición. No refrigerar ni congelar. Conservar en su envase original, bien cerrado.

PRESENTACIÓN

Frascos con 31 y 76 mL de producto.

Venta bajo Receta Médico Veterinaria.

USO VETERINARIO



Antiinflamatorios

FT0163NAC23082023R2V1

Fabricado por:
Virbac S.A.
1ère Avenue 2065 m L.I.D. - 06510
Carros - Francia.

Importado y distribuido en Chile por:
Centrovet Ltda.
Av. Los Cerrillos 602, Cerrillos - Santiago.
Teléfono: (56-2) 2583 7700 / Fax: (56-2) 2583 7701
e-mail: ventas@virbac.cl ; www.virbac.cl
Bajo licencia de Virbac S.A., Francia.

