

# ROSTRUM<sup>®</sup> PLUS - Emulsión Ótica

---

ANTIBACTERIANO Y ANTIMICÓTICO.



Indicado en el tratamiento de otitis externa aguda o crónica en perros, causada por bacterias y hongos sensibles a Enrofloxacino y/o Sulfadiazina de Plata.

## Ficha Técnica

### ESPECIES

---

Perros.

### FORMA FARMACÉUTICA

---

Emulsión ótica, antibacteriana y antimicótica

### ACCIÓN TERAPÉUTICA

---

Antibacteriano y antimicótico.

### COMPOSICIÓN

---

Cada mL de emulsión contiene:  
Enrofloxacino..... 5 mg  
Sulfadiazina de Plata..... 10 mg  
Excipientes c.s.p..... 1 mL

### INDICACIONES

---

Indicado en el tratamiento de otitis externa aguda o crónica en perros, causada por bacterias y hongos sensibles a Enrofloxacino y/o Sulfadiazina de Plata.

### MODO DE APLICACIÓN

---

Limpiar el conducto auditivo, luego administrar Rostrum® Plus en cantidad suficiente para cubrir el canal auditivo externo, masajear suavemente el oído para asegurar una distribución completa y uniforme del medicamento por todo el conducto.

### VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

---

Administración tópica.

**Dosis del producto:** 5 a 10 gotas en perros que pesan 15 kilos o menos, y 10 a 15 gotas en perros que pesan más de 15 kilos. Administrar 2 veces al día por 14 días.

### INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

---

No se recomienda utilizar en forma concomitante con otros productos farmacéuticos.

### CONTRAINDICACIONES

---

- No usar en perros que presenten hipersensibilidad a las Quinolonas y/o a las Sulfonamidas.
- No usar en perros con perforación de la membrana timpánica.
- No usar durante la gestación y la lactancia.

### PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

---

- El uso de esta asociación no ha sido evaluado en perros con perforación de la membrana timpánica. En consecuencia, antes de administrar el producto se debiera examinar el canal auditivo externo con el objetivo de asegurar que no exista ruptura de la membrana timpánica, con el objetivo de evitar contaminación del oído medio, como también lesiones vestibulares y cocleares. Si durante la administración del producto existiera signos de sordera o alteraciones vestibulares descontinúe su uso.
- Las Quinolonas debieran utilizarse con precaución en animales con desórdenes del sistema nervioso central (SNC). En esos animales, en casos poco frecuentes las Quinolonas han sido asociadas a estimulación del SNC, lo cual puede generar convulsiones.
- Las Fluoroquinolonas, como Enrofloxacino, no deben utilizarse como primera línea de tratamiento, excepto que no exista alternativa terapéutica disponible. Cuando se empleen como segundo tratamiento, deberá ser sobre la base de estudios de

susceptibilidad.

## PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

---

Lavarse las manos después de administrar el producto.

## ADVERTENCIAS

---

Mantener fuera del alcance de los niños.

## EFFECTOS ADVERSOS

---

- Con la excepción de posibles anomalías del cartílago en animales jóvenes, el perfil de efectos adversos del Enrofloxacin se limita generalmente a problemas gastrointestinales (vómitos, anorexia), aunque también se han reportado incidentes raros de elevación de las enzimas hepáticas, ataxia, convulsiones, depresión y letargo.
- No se han reportado evidencias de toxicidad sistémica por Sulfadiazina de Plata en perros, incluso se han utilizado suspensiones óticas de Sulfadiazina de Plata al 1% en perros por más de tres meses sin incidentes.

## OBSERVACIONES

---

Agitar antes de usar.

### **Precauciones especiales para la disposición del producto sin utilizar o el material de desecho:**

Desechar los restos de producto sin utilizar dentro de su envase original bien cerrado. Disponer los desechos de este producto con precaución junto con los desechos domésticos.

## CONSERVACIÓN

---

Mantener en un lugar fresco, a temperatura entre 15° y 30°C, al abrigo de la luz.

## CONDICIÓN DE VENTA

---

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

## PRESENTACIÓN

---

Frasco gotario con 15 mL

## ELABORADO POR

---

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

## REGISTROS

---

**Chile:** Reg. SAG N° 1523

**Bolivia:** Reg. SENASAG PUV-F-N° 006147/14

**El Salvador:** VE2014084963

## PAÍSES DONDE SE COMERCIALIZA

---

Importado y distribuido en Bolivia por:

ZOOFARMA

TEL: +(591)222-3357

Calle Díaz Romero 1339, entre avenida Saavedra y Avenida Busch, La Paz.

Distribuido en El Salvador por:

Rafael Alfredo Alfaro Castillo.

Importado y Distribuido en Perú por:

Representaciones Durand SAC.

Av. Manuel Olgún N° 501 Oficina N° 604 Santiago de Surco Lima.

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario